

Health Watch : Human/Poultry/Swine

Human O สถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1

- ตั้งแต่ ม.ค. 2014 – 10 เม.ย. 2014 พบผู้ติดเชื้อ H5N1 จำนวน 13 ราย เสียชีวิต 6 ราย
- โดยมีผู้ป่วยจากไวรัส H5N1 พบที่เวียดนาม 2 ราย กัมพูชา 9 รายและจีน 2 ราย สำหรับผู้เสียชีวิตพบที่เวียดนาม 2 รายและกัมพูชา 4 ราย

O สถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9

- ตั้งแต่ มี.ค. 2013 – 10 เม.ย. 2014 พบผู้ติดเชื้อ H7N9 สะสมรวม 412 ราย เสียชีวิต 121 ราย
- สำหรับผู้ติดเชื้อ H7N9 ส่วนมากพบในประเทศจีนจำนวน 401 รายฮ่องกงจำนวน 8 ราย ไต้หวัน 2 ราย และมาเลเซีย 1 ราย (ผู้ติดเชื้อที่มาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน)

O สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV)

- ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2014 สรุปยอดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ 211 ราย เสียชีวิต 88 ราย คิดเป็นอัตราการป่วยตาย ร้อยละ 41.71 โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 11 ประเทศ ดังนี้ จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส ตูนิเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน และคูเวต

O ไวรัส “Ebola” ในแอฟริกา ระบาดไม่หยุด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากนานาชาติระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนั้นได้เพิ่มเป็นอย่างน้อย 95 รายแล้ว ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้เพิ่มเป็นอย่างน้อย 143 ราย โดยที่ต้นตอการระบาดที่ประเทศกินีถือเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด คือ 84 คน รองลงมา คือ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเซียร์รา ลีโอน และไลบีเรีย ที่มีผู้เสียชีวิต 6 รายและ 5 รายตามลำดับ

- ทั้งนี้ทาริด ยาซาเรวิช โฆษกองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมายอมรับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอาจมีสูงถึง 400 ราย
- ขณะที่ประเทศที่มีพรมแดนติดกับกินีอย่างประเทศเซเนกัล ได้สั่งปิดพรมแดน และสั่งปิดตลาดนัดบริเวณนั้นด้วย
- สำหรับในประเทศกินี ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกคำสั่งห้ามการจำหน่ายและการบริโภค “ค่างควา” สายพันธุ์ต่างๆทั้งหมด ทั้งนี้อาหารที่ใช้เนื้อและชิ้นส่วนต่างๆ ของค่างควาถือเป็น “เมนูยอดนิยม” ของชาวกินี
- นอกจากนี้ คำแถลงขององค์การอนามัยโลกที่มีการเผยแพร่จากนครเจนีวา ยังมีการระบุว่า ขณะนี้มีพลเมืองของแคนาดารายหนึ่งมีอาการป่วยและต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบล่า หลังจากเพิ่งเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกาตะวันตก

Livestock O EU มั่นใจไก่ไทยได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ไร้ออร์โมนและสารปฏิชีวนะ ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสัตว์กระทรวงสาธารณสุขและผู้บริโภคแห่งคณะกรรมการยุโรป (SANCO) กล่าวภายหลังกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านหลักสวัสดิภาพสัตว์แก่ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดโดยสหภาพยุโรปร่วมกับประเทศไทยว่า สวัสดิภาพสัตว์ที่มีความสำคัญมิใช่ต่อภาคปศุสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีต่อความยั่งยืนของการเกษตรโดยรวมด้วย นอกจากนี้ อัตราขาทดที่ปรึกษาสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยยังได้กล่าวชื่นชมการให้ความสำคัญและการดำเนินการด้านสวัสดิภาพสัตว์ในไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อความปลอดภัยทางอาหาร

- สำหรับในประเทศไทย ขณะนี้มีภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Animal Welfare จากการให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานสากลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และมาตรฐานหลักปฏิบัติและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU)
- การปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์จะทำให้ไก่มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะในการเร่งการเจริญเติบโต

O กรมปศุสัตว์แจ้งเตือนการเกิดโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 ที่สาธารณรัฐประชาชนลาว นายทฤษฎี ขาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2014 ว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N1) เกิดขึ้นที่แขวงไซยบุรี (XAYABOURY) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

ผู้จัดทำ : สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์บก/เครือข่ายโรคภัย AHTSO@truemail.co.th

From : www.acfs.go.th, www.boe.moph.go.th, www.dld.go.th, www.cueid.org, www.oie.int

- จากข้อมูลดังกล่าวทางอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สั่งการให้ด่านกักสัตว์ตามแนวชายแดนทุกด่านเข้มงวดตรวจสอบบุคคลเข้าออก ไม่มีการนำสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศลาวเข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ

Poultry O พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ระบาดครั้งใหม่ในลาว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2014 หน่วยงานปศุสัตว์ของลาว ยืนยันพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกที่ Nator Ngai เขต Xayabury ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งติดกับชายแดนไทย ซึ่งถือเป็นการระบาดอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้พบการระบาดครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2008

- ทั้งนี้ การระบาดของโรคไข้หวัดนกในลาวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2014 โดยพบสัตว์ปีกที่แสดงอาการจำนวน 457 ตัว ซึ่งทางการได้ทำลายสัตว์ปีกในกลุ่มเสี่ยงที่เหลือทั้งหมดแล้ว

O งานวิจัยเผยเมืองฮูโจว (Huzhou) อาจเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดเชื้อไวรัส H7N9 งานวิจัยในวารสาร Journal of Virology ที่จัดทำโดย Institute Pasteur of Shanghai ได้เปิดเผยผลการวิจัยพบว่า เมื่อเดือนเมษายน 2013 มีการตรวจพบการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ในกลุ่มสัตว์ปีก ประกอบกับเนื่องจากเมืองฮูโจวติดกับทะเลสาบไท่ฮูที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของนกในธรรมชาติถึง 2 แห่ง ดังนั้นเมืองฮูโจวจึงอาจเป็นต้นกำเนิดของเชื้อไวรัส H7N9 ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์

O OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information; report date)

- (31/03/14) ลาว พบการติดเชื้อ H5N1 ในสัตว์ปีก มีสัตว์ติดเชื้อ 5,142 ตัว ป่วย 457 ตัว (8.89%)

Swine O สหรัฐฯ พบการระบาดของ PED ครั้งแรกในรัฐเวอร์มอนต์ จากการตรวจวิเคราะห์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ในรัฐเวอร์มอนต์ ได้ตรวจพบการระบาดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) ส่งผลให้สุกรเสียชีวิต 100% ในฟาร์มที่ติดเชื้อ

- ทั้งนี้ มีการตรวจพบการติดเชื้อ PED ครั้งแรกในสหรัฐในช่วงต้นปี 2013 และมีการแพร่ระบาดถึง 4,000 แห่ง ใน 27 รัฐ สำหรับรัฐเวอร์มอนต์ถือเป็นรัฐที่ 28 ที่ตรวจพบ

O ญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการเข้มยับยั้งการแพร่ระบาดโรค PED กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น ประกาศมาตรการควบคุมสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อภายในฟาร์มสุกร เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea : PED) ซึ่งสร้างความเสียหายทั่วประเทศ หลังจากตรวจพบโรค PED เมื่อเดือนตุลาคม 2013 ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในรอบ 7 ปี และได้ขยายตัวไปแล้วกว่า 18 เมือง ทำให้สุกรตายไปแล้วกว่า 39,000 ตัว

- ทั้งนี้กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่น แถลงว่าการแพร่ระบาดในปัจจุบันมีความรุนแรงมากกว่าเมื่อปี 1996

O OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กบที่สำคัญ (Disease Information; report date)

- (1/04/14) อูรุกวัย พบการติดเชื้อ Rabies ในวัว 2,819 ตัว ป่วย 24 ตัว และในสุกร 5 ตัว (ไม่มีสุกรแสดงอาการ)
- (2/04/14) เกาหลีเหนือ พบการติดเชื้อ FMD type O ในสุกร มีสุกรติดเชื้อ 52 ตัว ป่วย 9 ตัว (17.31%)
- (3/04/14) มองโกเลีย พบการติดเชื้อ PRRS ในสุกร มีสุกรติดเชื้อ 337 ตัว ตาย 44 ตัว (13.06%)

O สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กบที่สำคัญ

- รายงานโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) ที่พบในเดือนมี.ค. 2014 ในวัว ที่ลพบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เป็น FMD type A

Environment O ยุง! แหล่งต้นเหตุของโรคติดเชื้อ นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยยุงเป็นสาเหตุการป่วยของโรคติดเชื้อสำคัญในไทยถึง 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ชิคุนกุนยา ไข้ซัง และมาลาเรีย โดยในปี 2013 พบรวมกัน 170,051 ราย เสียชีวิต 159 ราย เร่งรณรงค์ประชาชนปรับสภาพสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

- สำหรับโรคจากยุงอันดับ 1 ในปี 2013 คือโรคไข้เลือดออกมีผู้ป่วยสะสม 153,765 ราย และมีผู้เสียชีวิต 132 ราย
- สำหรับปี 2014 มาเลเซียพบการระบาดสูงขึ้นถึง 4 เท่า ขณะนี้มีผู้ป่วยแล้ว 22,000 ราย ซึ่งสาเหตุอาจมาจากภูมิทัศน์และชนิดของเชื้อที่แตกต่างไปจากเดิม