

Health Watch : Human/Poultry/Swine

- Human**
- กัมพูชาพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก H1N1 เป็นรายแรก โดยผู้ป่วยรายดังกล่าว เป็นช่างกลึงของสถานโพรทซ์นชาว กัมพูชา วัย 30 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 59 หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงพนมเปญถึงเป็นผู้เสียชีวิต รายแรกของกัมพูชา จากการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2553
 - ส่องกพบผู้ติดเชื้อหวัดนก H7N9 รายแรกของปี เป็นชายวัย 60 ปี จากเมืองซูโจว ในมณฑลเจียงซู ของจีนแผ่นดินใหญ่ ศูนย์ป้องกันโรค (ซีเอชพี) ของฮ่องกง รายงานว่าผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาฮ่องกงเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ก่อนจะเริ่มมีอาการป่วยจาก ไข้หวัด และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวม ต่อมาห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของฮ่องกงตรวจพบการติดเชื้อไข้หวัดนก H7N9 จึงส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลปรีนเซส มาร์กาเรต
 - โรงพยาบาลมุกดาหารเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างต่อเนื่อง กำชับแพทย์ รณรงค์ประชาชนร่วม “มาตรการ 3 เก็บ” หวังป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งลดจำนวนลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคให้ได้มากที่สุด หากพบผู้ป่วยสงสัยใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง, หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น, กลุ่มผู้ป่วยไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน, เด็กแรกคลอดที่มีศีรษะ เล็กผิดปกติ และกลุ่มอาการเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ ให้ใช้มาตรการ 3-3-1 ทันที ได้แก่ แจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่ เร็วภายใน 3 ชั่วโมง, ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง และดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน โดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
 - เกาหลีใต้เผยปี 59 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 2.6 เท่าจากปีก่อน ซึ่งผู้ป่วยทุกคนล้วนติดเชื้อโรคไข้เลือดออกระหว่างที่ อยู่ในต่างประเทศ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ได้ออกคำเตือนต่อชาวเกาหลีใต้ ที่อยู่ระหว่างการเดินทางไป กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกบ่อยครั้ง ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ แนะนำให้พกเครื่องป้องกันยุงติดตัวไปด้วย
 - สหรัฐอเมริกาพบ “ไวรัสซิกา” ผ่านการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มอีก 6 ราย สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคระบาด สหรัฐฯ (CDC) พบว่าผู้ป่วยทั้ง 6 รายรับเชื้อจากผู้เดินทางเพศชายผ่านทางเพศสัมพันธ์ และคาดว่าในอนาคตน่าจะมีการ ติดต่อไวรัสซิกาผ่านทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น
 - สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) มีคำสั่งอนุมัติ ให้สามารถใช้ยุงที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาทดลองเพื่อลดการ แพร่ระบาดของไวรัสซิกา รวมถึงโรคติดต่ออื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะได้
 - จีนพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่ในมณฑลกว่างตุง คณะกรรมการสุขภาพและการวางแผนครอบครัวมณฑลกว่างตุง ทางภาคใต้ของจีนเปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่ 2 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 8 ปีและเด็กชายอายุ 6 ปี โดยทั้งสอง เป็นพี่น้องกัน และพบว่าเพิ่งกลับจากประเทศเวเนซุเอลา ทั้งนี้ประเทศจีนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาที่ได้รับการยืนยัน แล้ว 8 ราย
 - เกาหลีใต้เผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกของประเทศ โดยเป็นชายชาวเกาหลีใต้ อายุ 43 ปี หลังเพิ่งเดินทางกลับจาก การทำงานที่ประเทศบราซิลนาน 22 วัน
 - พ่อแม่ต้องระวัง 3 ไวรัสร้าย ภัยคุกคามลูกเล็กในหน้าร้อน ได้แก่ 1. Enteroviruses 71 (สาเหตุของโรคปากและเท้า เปื่อยในเด็กอายุ 0-5 ปี) 2. ไวรัสหวัด 3. พิชสูนขบ้า
- Poultry**
- OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกได้ดังนี้
เอเชีย : เวียดนาม พบการติดเชื้อ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 1,100 ตัว ป่วย 796 ตัว (72.36%)
 - จีน พบการติดเชื้อ H5N6 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 34,233 ตัว ป่วย 15,217 ตัว (44.45%)
 - จีน (ไทเป) พบการติดเชื้อ H5N2 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 249,490 ตัว ตายรวมทำลาย 100%
 - จีน (ไทเป) พบการติดเชื้อ H5N8 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 20,350 ตัว ป่วย 10,691 (52.54%)

- **OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information; report date)** โดยสรุปสถานการณ์นิวคาสเซิลได้ดังนี้
ยุโรป : บัลแกเรีย พบการติดเชื้อ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 676 ตัว ป่วย 15 ตัว (2.22%)

Swine

- **OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบที่สำคัญ (Disease Information ; report date)**
 - พบการติดเชื้อ African swine fever (ASF) ในสุกรที่ประเทศมาลี รัสเซีย โปแลนด์ บรูไน และยูเครน
 - พบการติดเชื้อ Classical swine fever ในสุกรที่ประเทศลัตเวีย
 - พบการติดเชื้อ FMD ในสุกร (type O) ที่ประเทศจีน และเกาหลี
 - พบการติดเชื้อ Anthrax ในวัว ที่ประเทศคีร์กีซสถาน

Environment

- **ผู้เชี่ยวชาญห่วง การกระทำของมนุษย์พาโลกจมสู่ท้องทะเล** ตามรายงานการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Proceedings of National Academy of Sciences ในระยะเวลาอีกไม่เกิน 100 ปีหลังจากนี้ หลายเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณชายฝั่ง อาจจมลงสู่ใต้ท้องทะเล ด้วยสาเหตุใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่ได้ทำการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมรวมถึงระบบภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจากการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
- **ซีพีเอฟ ไขว่คว้าบรรณาการจัดการ Food Loss-Food Waste ลดภาวะโลกร้อน** ซีพีเอฟได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรที่หลากหลายซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้โครงการ “ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” (CPF's Product Sustainability) เพื่อลดปริมาณการสูญเสียอาหาร รวมไปถึงการนำของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน จนกระทั่งได้รับฉลากลดโลกร้อน หรือฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลำสุตไก่เนื้อ และลูกไก่เนื้อ ยังได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อนด้วยเช่นกัน นับเป็นอีกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- **ดีกรอบเศรษฐกิจโลก ปี 73 ลดก๊าซเรือนกระจก 90%** รายงานเศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่ ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ (The Global Commission on the Economy and Climate) ตอกย้ำว่า รัฐบาลและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผลการศึกษาพบว่า ในระยะเวลาสิบห้าปีต่อจากนี้ เมืองใหญ่ในโลกจะใช้งบลงทุนจำนวน 9 หมื่นล้านล้านเหรียญสหรัฐในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และพลังงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ (Low carbon growth) ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ในด้านการสร้างงาน สุขภาพ การผลิตเชิงธุรกิจ และคุณภาพชีวิต