

มาตรการป้องกันและเฝ้า ระวัง !!
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)



โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(African swine fever)



01

มีอันตรายสูง

02

ไม่มียารักษา

03

ไม่มีวัคซีนป้องกัน



“ 4 ป้องกัน ”



โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African swine fever)



1. ไม่นำอาหาร เศษอาหารที่มี
ส่วนประกอบของสุกรเข้ามาในฟาร์ม
(ทั้งสำหรับคนและสัตว์)



4

ป้องกัน



2. ทำความสะอาด**ฆ่าเชื้อ** โรงเรือน อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มและที่นำเข้ามาใหม่




4

ป้องกัน



3. **ไม่**ปล่อยให้สัตว์พาหะเข้าฟาร์ม
(หมู, หมูป่า, เห็บ, แมลงวัน)



4

ป้องกัน



4. ต้องเข้มงวดในการควบคุม ป้องกันโรค ตามระบบ **Biosecurity**



4

ป้องกัน



“ 4 ปฏิบัติ ”



โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African swine fever)



1. พบสุกรตายเฉียบพลัน พบปื้นเลือดออกตามตัว ไข้สูง ถ่ายเป็นเลือด **ต้องแจ้ง** สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที



4

ปฏิบัติ



2. ห้ามผ่าซากหรือชำแหละ
และเคลื่อนย้ายสุกรที่ตายโดยเด็ดขาด



4

ปฏิบัติ



3. เก็บเลือดสุกรป่วยที่สงสัย ส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด



4

ปฏิบัติ



4. หากได้รับการยืนยันผล**ต้องทำลาย**สุกร
ทั้งหมดโดยการเผาและฝังให้เร็วที่สุด



4

ปฏิบัติ



“

โปรตรระวังวัคซีนเถื่อน

ASF ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

”



โรคนี้อันตรายถึงชีวิตและทำลายอาชีพผู้เลี้ยงสุกร



Thank you